

Modified Aldrete Score - variante Ma et al. 2023

Paziente: _____ Data: _____

Pressione arteriosa basale: _____

1. Attività motoria

- ☐ Non muove gli arti e non riesce a sollevare il capo (0 pt)
- ☐ Muove braccia o gambe; solleva il capo in modo limitato (1 pt)
- ☐ Muove braccia, gambe e capo spontaneamente o su richiesta (2 pt)

2. Respirazione

- ☐ Apnea o necessità di assistenza ventilatoria (0 pt)
- ☐ Respirazione limitata, dispnea o respiro superficiale (1 pt)
- ☐ Respira profondamente e tosse efficacemente (2 pt)

3. Pressione arteriosa rispetto al valore pre-anestesia

- ☐ Scostamento pari o superiore al 50% (0 pt)
- ☐ Scostamento del 20-49% (1 pt)
- ☐ Scostamento inferiore al 20% (2 pt)

4. Stato di coscienza

- ☐ Non responsivo (0 pt)
- ☐ Risvegliabile alla chiamata (1 pt)
- ☐ Completamente sveglio (2 pt)

5. Saturazione periferica di ossigeno (SpO₂)

- ☐ Inferiore al 92% nonostante ossigenoterapia (0 pt)
- ☐ Superiore al 92% con ossigenoterapia (1 pt)
- ☐ Superiore al 92% in aria ambiente (2 pt)

Punteggio totale: _____

Interpretazione:

- 0-8: Sotto la soglia comunemente usata per il recupero di fase I: proseguire valutazione e assistenza
- 9-10: Soglia comune di recupero di fase I raggiunta: verificare comunque tutti i criteri di dimissione

Attribuzione: Adattamento italiano della tabella 3 di Ma X et al., Trials 2023, CC BY 4.0. Traduzione e impaginazione DottAI; criteri e soglie della tabella mantenuti.

Licenza e condizioni: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Compilalo online con punteggio automatico: <https://tools.dottai.it/scale-valutazione/modified-aldrete/>

Offerto da DottAI - Il gestionale per professionisti sanitari - www.dottai.it