

UFEPS-SF - scala breve del dolore felino

Paziente: _____ Data: _____

Area dolente o procedura: _____

Ultimo analgesico e orario: _____

Tempo dalla fine dell'anestesia: _____ (Nessuna anestesia recente / Meno di 1 ora / 1 ora o più)

1. Valutare per 2 minuti la postura del gatto all'interno della gabbia

- ☐ 0 - Naturale, rilassato e/o si muove normalmente (0 pt)
- ☐ 1 - Naturale ma contratto, non si muove o si muove poco o è riluttante a muoversi (1 pt)
- ☐ 2 - Posizione incurvata e/o decubito dorso-laterale (2 pt)
- ☐ 3 - Cambia frequentemente posizione o è irrequieto (3 pt)

2. Comportamenti presenti: contrae ed estende gli arti posteriori e/o contrae i muscoli addominali (fianco); ha gli occhi parzialmente chiusi (non considerare questo indicatore fino a un'ora dopo la fine dell'anestesia); lecca e/o morde la parte dolente; muove la coda con forza

- ☐ 0 - Tutti i comportamenti anzidetti sono assenti (0 pt)
- ☐ 1 - Presenza di uno dei comportamenti anzidetti (1 pt)
- ☐ 2 - Presenza di due dei comportamenti anzidetti (2 pt)
- ☐ 3 - Presenza di tre o tutti i comportamenti anzidetti (3 pt)

3. Comfort, attività e atteggiamento all'apertura della gabbia, e interesse nei confronti dell'osservatore e/o dell'ambiente circostante

- ☐ 0 - A suo agio ed interessato (0 pt)
- ☐ 1 - Calmo e poco interessato (1 pt)
- ☐ 2 - Calmo e non interessato; può essere rivolto verso la parte posteriore della gabbia (2 pt)
- ☐ 3 - A disagio, irrequieto, poco o per niente interessato; può essere rivolto verso la parte posteriore della gabbia (3 pt)

4. Reazione quando toccato e poi delicatamente palpato intorno alla parte dolente

- ☐ 0 - Non reagisce (0 pt)
- ☐ 1 - Non reagisce quando si tocca la parte dolente, ma reagisce alla palpazione delicata della parte (1 pt)
- ☐ 2 - Reagisce sia quando la parte dolente viene toccata che quando viene palpata (2 pt)
- ☐ 3 - Non permette la palpazione (3 pt)

Punteggio totale: _____

Interpretazione:

- 0-2: Punteggio sotto la soglia di intervento. Continua la valutazione clinica e il monitoraggio: il giudizio veterinario può indicare analgesia anche sotto soglia.
- 3: Zona d'incertezza diagnostica. Rivaluta il gatto, integra i reperti clinici e considera l'analgesia secondo giudizio veterinario.
- 4-12: Soglia raggiunta: la UFEPS-SF indica analgesia di salvataggio, con scelta e somministrazione affidate al medico veterinario, seguite da rivalutazione.

Attribuzione: Versione italiana UFEPS-SF tratta da Luna SPL et al. Multilingual validation of the short form of the Unesp-Botucatu Feline Pain Scale (UFEPS-SF). PeerJ. 2022;10:e13134. Licenza Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).

Licenza e condizioni: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Compilato online con punteggio automatico: <https://tools.dottai.it/scale-valutazione/ufeps-sf-gatto/>

Offerto da DottAI - Il gestionale per professionisti sanitari - www.dottai.it